

HNOJIVO EU: KfV 1(C)(I)(a)(i): Jednozáložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinami

(S) (90)

90 v hmotnostných % síra (S) - elementárni, celkový

Složky: síra¹ (CAS 7704-34-9), bentonit¹ (CAS 1302-78-9)

¹KSM 1: Látky a smesi z pôvodného materiálu

SULFOGRANULÁT spĺňa požiadavky nariadení (EU) 2018/848 a je povolené pre ekologické zemiedelství.

Granulometrie: Granule. Alespoň 90 % výrobku prejde sítom s oky o veľkosti 6 mm. Nie viac než 10 % výrobku prejde sítom s oky o veľkosti 2 mm.

Výrobce/zabíal/a: Hechenbichler GmbH Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakousko Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.hechenbichler.com

Dovozce: AMALGEROL CZ s.r.o. Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.cz



Pokyny

Skladování: Udržovať obaly těsně uzavřené a uchovávat na chladném, dobře větraném místě. Doporučená skladovací teplota: Hodnota +5 °C až +25 °C. Chráněte před mrazem, teplem, slunečním zářením. Uchovávat odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Udržujte zdroje zápalení mimo dosah. Nekombinujte s jinými látkami kvůli vysoké reaktivitě síry. Maximální počet naskládaných vrstev vytlu je: 7 vrstev.



Doba použitelnosti: Při správném skladování může být skladován po dobu nejméně 24 měsíců od data plnění (viz číslo šarže).

Pokyny pro likvidaci: Zamezte vzniku odpadů nebo pokud je to možné, zajistěte minimalizaci odpadů. Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. Odstranění v souladu s lokálními a národními předpisy.

Oblast použití

Aplikovat pomocí vhodného rozmetadla, je možné smíchat s jinými minerálními hnojivy. Pokud možno mělce zapravit. Vhodné také k zapracování do základní směsi hnojiv.

Řepka: Prevence: zlepšení využití N, **Dávkování:** 10 - 30 kg/ha, **Doba aplikace:** podzim 10 kg/ha, jaro 20 - 30 kg/ha

Cukrovka, Kukuřice: Prevence: zlepšení využití N, **Dávkování:** 25 kg/ha, **Doba aplikace:** jaro

Obiloviny, Kukuřice: Prevence: zlepšení využití N, **Dávkování:** 25 kg/ha, **Doba aplikace:** podzim-jaro

Brambory: Prevence: zlepšení využití N, **Dávkování:** 30 - 50 kg/ha, **Doba aplikace:** jaro 30 kg/ha, při strupovitosti 50 kg/ha

Zelenina, Vinná Réva, Ovoce: Prevence: zlepšení využití N, **Dávkování:** 30 - 50 kg/ha, **Doba aplikace:** jaro

HNOJIVO EÚ: PFC 1(C)(I)(a)(i): Jednozáložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

(S) (90)

90 v hm. % elementárnej síry (S), celkového

Složky: síra¹ (CAS 7704-34-9), bentonit¹ (CAS 1302-78-9)

¹CMC 1: Pôvodné látky a zmesi

SULFOGRANULÁT spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2018/848 a je povolená pre ekologické ekologické poľnohospodárstvo.

Granulometria: Granuly. Najmenej 90 % produktu prejde sítom s veľkosťou oka 6 mm. Nie viac ako 10 % produktu prejde sítom s veľkosťou oka 2 mm.

Výrobca/Zabíal: Hechenbichler GmbH Cusanusweg 7-9, 6020 Innsbruck, Rakúsko Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.hechenbichler.com

Dovozca: AMALGEROL SK s.r.o. Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.sk



CZ Bezpečnost	SK Bezpečnosť
Signální slova: VAROVÁNÍ	Výstražné slovo: POZOR
Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži.	Výstražné upozornění: H315 Dráždí kůži.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302 + P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.	Bezpečnostné upozornění: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
SULFOGRANULÁT obsahuje síru: Index č: 016-094-00-1 - UFI: 1500-H03K-K001-SUEM	
Nebezpečí požáru a výbuchu sirného prachu: Za každou cenu zabránite tvorbe a hromadení prachu ve vzduchu. Zajistěte dobré větrání/odsávání během přepravy, dekantace a ve skladovacích a pracovních prostorách. Udržujte se mimo dosah potenciálních spouštěčů výbuchu (otevřený oheň, jiskry, elektrická zařízení). Přijměte opatření proti elektrostatickému náboji. Nemíchejte sulfogranulát do kejdy! Při práci nejzte, nepijte a nekuřte.	Nebezpečnosť požiariu a výbuchu sírového prachu: Za každú cenu zabránite tvorbe a hromadeniu prachu vo vzduchu. Zabezpečte dobré vetranie/odsávanie počas prepravy, dekantácie a v skladovacích a pracovných priestoroch. Držte sa ďalej od potenciálnych spúšťačov výbuchu (otvorený oheň, iskry, elektrické zariadenia). Prijmite opatrenia proti elektrostatickému nabitíu. Nemiešajte sulfogranulát do hnoejnej suspenzie! Počas práce nejzte, nepite a nefajčite.

Pokyny

Skladovanie: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú a uskladnenú na chladnom, dobre vetranom mieste. Odporúčaná teplota skladovania: +5 °C - +25 °C. Chránite pred mrazom, teplom, a snečným žiarením. Uchovávať ich oddelene od potravín a krmiva. Uchovávať mimo dosahu detí a domácich zvierat. Uchovávať zdroje vznietenia mimo dosahu. Nekombinujte s inými látkami kvôli vysokej reaktivite síry. Maximálny počet naplocho ležiacich balení (vreciek): 7 vrstiev.

Trvanlivosť: pri správnom skladovaní sa môže skladovať najmenej 24 mesiacov. od dátumu plnenia (pozri číslo šarže).

Pokyny na likvidáciu: Zabráňte vzniku odpadu alebo ak je to možné zabezpečiť minimalizáciu odpadu. Nevychadzte s odpadom z domácnosti. Nedovoľte, aby došlo k úniku do kanalizácie. Likvidujte v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi.

Oblast použití

Aplikujte pomocou vhodného rozmetadla, môže sa miešať s inými minerálnymi hnojivami. Pľtké zapracovanie, ak je to možné. Vhodné aj na zapracovanie do základnej zmesi hnojiv.

Řepka olejná: Prevencia: zlepšenie využívania N, **Aplikačná dávka:** 10 - 30 kg/ha, **obdobie aplikácie:** jeseň 10 kg/ha, jar 20 - 30 kg/ha

Cukrová repa, Kukurica: Prevencia: zlepšenie využívania N, **Aplikačná dávka:** 25 kg/ha, **Doba aplikácie:** jar

Obilniny, Kukurica: Prevencia: zlepšenie využívania N, **Aplikačná dávka:** 25 kg/ha, **Doba aplikácie:** jar

Zemiaky: Prevencia: zlepšenie využívania N, **Aplikačná dávka:** 30 - 50 kg/ha, **Doba aplikácie:** jar 30 kg/ha, 50 kg/ha v prípade chrastovitosti

Zelenina, Vinná Réva, Ovocie: Prevencia: zlepšenie využívania N, **Aplikačná dávka:** 30 - 50 kg/ha, **Doba aplikácie:** jar

Obsah/Obsahu: 25 kg

www.amalgerol.cz
www.amalgerol.sk



HECHENBICHLER
A BOOST FOR SOIL, PLANTS AND ANIMALS

